


# SU DIARIO DEL TRATAMIENTO

para llevar un registro  
de cómo se siente  
durante el tratamiento  
con CABOMETYX

Representación  
de un paciente

- Para personas que toman CABOMETYX en combinación con OPDIVO® (nivolumab) o OPDIVO Qvantig™ (nivolumab+ hyaluronidase-nvhy)
- Para personas que toman CABOMETYX solo

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

 **CABOMETYX**<sup>®</sup>  
(cabozantinib) tablets  
60 mg | 40 mg | 20 mg

## Lleve un registro de cómo se siente

Este Diario del Tratamiento lo ayudará mientras tome CABOMETYX solo o en combinación con OPDIVO® (nivolumab) o OPDIVO Qvantig™ (nivolumab+ hyaluronidase-nvhy).

### Su equipo de atención médica está disponible para ayudarlo.

Ellos son el mejor recurso para obtener información sobre su tratamiento.

- Infórmeles si experimenta algún síntoma de efecto secundario. El equipo de atención médica está disponible para ayudarlo a manejarlos.
- Cuanto antes les comunique sus síntomas, antes recibirá apoyo.

### Asegúrese de tomar la dosis que recomienda su médico



Llame a su equipo de atención médica de inmediato si no se siente bien.

La información en este diario no sustituye el asesoramiento de su equipo de atención médica.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

Para fomentar el trabajo conjunto con su equipo de atención médica en el manejo de ciertos efectos secundarios, contamos con un enfoque llamado RIM.



#### RECONOCER

si se siente diferente; esto podría ser un síntoma o un efecto secundario



#### INFORMAR

inmediatamente a su equipo de atención médica



#### MANEJAR

los efectos secundarios trabajando junto con su equipo de atención médica

Su médico o enfermera podría cambiar la dosis de CABOMETYX, suspender su administración temporalmente o interrumpir el tratamiento de manera permanente si usted presenta determinados efectos secundarios. Tenga en cuenta que no todos los efectos secundarios se pueden controlar y algunos podrían requerir la discontinuación permanente del medicamento.

### Asegúrese de utilizar la Tarjeta de billetera



[Haga clic aquí](#) para obtener una versión imprimible de esta Tarjeta de billetera.

Úsela para anotar los nombres y números de teléfono de su equipo de atención médica y los medicamentos que toma.

## Cómo tomar CABOMETRYX (cabozantinib)

CABOMETRYX es una **tableta no quimioterapéutica** que se puede tomar en casa una vez al día o según las indicaciones del médico.

Tome CABOMETRYX según las indicaciones de su médico. No suspenda ningún medicamento sin la indicación de su médico.

### QUÉ HACER



- Trague las tabletas de CABOMETRYX enteras
- Tome su dosis de CABOMETRYX a la misma hora todos los días o según indicaciones del médico
- Tome CABOMETRYX con el estómago vacío, al menos una hora antes o al menos dos horas después de comer

### QUÉ NO HACER



- No tome CABOMETRYX con la comida
- No triture, mastique ni parta las tabletas



- **No tome jugo de pomelo (toronja), no coma pomelo y no ingiera suplementos que contengan pomelo ni hierbas de San Juan (“St. John’s wort”)** durante el tratamiento con CABOMETRYX

Informe a su equipo de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos, las vitaminas y los suplementos herbales recetados o de venta libre.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

Si toma CABOMETRYX en combinación con OPDIVO® (nivolumab) o OPDIVO Qvantig™ (nivolumab+hyaluronidase-nhvy), consulte las **páginas 6 a 9**.

Si toma CABOMETRYX solo, consulte las **páginas 10 a 11**.

### ¿Qué sucede si olvida tomar CABOMETRYX?

Si su próxima dosis es en:

#### Menos de 12 horas

- No compense la dosis olvidada
- Tome la siguiente dosis en el horario habitual

#### 12 horas o más

- Hable con su médico o enfermera si se saltea una dosis

**Llame a su equipo de atención médica de inmediato** si toma demasiado CABOMETRYX.

**Cómo tomar CABOMETYX** (cabozantinib)  
**en combinación con OPDIVO®** (nivolumab)  
 o **OPDIVO Qvantig™** (nivolumab+hyaluronidase-nvhy)

Continúe tomando CABOMETYX según las indicaciones de su médico y use la tabla a continuación para llevar un registro de sus citas de tratamiento

Para saber cuándo le administrarán los tratamientos, prográmelos junto con su enfermera.

Número de tratamiento OPDIVO	Fecha/Hora
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

Use esta tabla RIM para llevar un registro de sus síntomas y anotar sugerencias de su equipo de atención médica



**RECONOCER**

si se siente diferente; esto podría ser un síntoma o un efecto secundario



**INFORMAR**

inmediatamente a su equipo de atención médica



**MANEJAR**

los efectos secundarios trabajando junto con su equipo de atención médica

Síntoma/Fecha	Con quién hablé	Recomendaciones
Su síntoma y cuándo ocurrió	Nombre del miembro del equipo de atención médica	Recomendación del miembro del equipo de atención médica para manejar su síntoma

Continúa en página 8





## Indicaciones e información importante de seguridad

### ¿Qué es CABOMETRYX?

CABOMETRYX es un medicamento recetado que se usa para tratar:

- A personas con cáncer de riñón (carcinoma de células renales). CABOMETRYX se puede utilizar:
  - En combinación con nivolumab para tratar a personas con carcinoma de células renales (CCR) que se ha propagado (CCR avanzado) y que aún no han recibido tratamiento.
  - Como medicamento único para tratar a personas con CCR avanzado.
- A personas con cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular) que fueron previamente tratadas con el medicamento sorafenib.
- A adultos y niños a partir de los 12 años que tienen un tipo de cáncer de tiroides denominado cáncer de tiroides diferenciado (DTC) que se haya propagado (avanzado a nivel local o metastásico), **y**,
  - que haya progresado después de una terapia previa dirigida a VEGFR **y**
  - su DTC ya no pueda tratarse con yodo radioactivo o no esté en condiciones de recibir tratamiento con yodo radioactivo.
- A adultos y niños a partir de los 12 años con tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET) o extrapancreáticos (epNET) que han recibido tratamiento previo, no son candidatos para cirugía y la enfermedad se haya propagado (avanzado a nivel local o metastásico).

No se sabe si CABOMETRYX es seguro y efectivo en los niños menores de 12 años.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABOMETRYX?

**CABOMETRYX podría provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

**Sangrado (hemorragia).** CABOMETRYX puede causar sangrado grave que podría provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta alguna señal de sangrado durante el tratamiento con CABOMETRYX, incluidas las siguientes:

- tos con sangre o coágulos de sangre
- vómito de sangre o vómito con forma de granos de café
- heces rojas o negras (como brea)
- sangrado menstrual más espeso de lo normal
- cualquier sangrado inusual o espeso

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

**Un desgarro en el estómago o en la pared intestinal (perforación) o una conexión anormal entre dos partes del cuerpo (fístula).** Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene sensibilidad o dolor en el área del estómago (abdomen) que es grave o que no desaparece.

**Coágulos de sangre, derrames cerebrales, ataques al corazón y dolor en el pecho.** Si experimenta alguno de los siguientes problemas, obtenga ayuda de emergencia de inmediato:

- hinchazón o dolor en los brazos o las piernas
- falta de aire
- sensación de aturdimiento o desmayos
- más sudoración de lo normal
- adormecimiento o debilidad en el rostro, los brazos o las piernas, especialmente en un lado del cuerpo
- confusión repentina o dificultad para hablar o entender
- dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos
- dificultad repentina para caminar
- mareos, pérdida del equilibrio o de la coordinación
- fuerte dolor de cabeza repentino

**Presión arterial alta (hipertensión).** La hipertensión es común durante el tratamiento con CABOMETRYX y, a veces, puede ser grave. Su proveedor de atención médica le controlará la presión arterial antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX y regularmente durante el tratamiento con CABOMETRYX. Si es necesario, también podría recetarle medicamentos para tratar la presión arterial alta. Informe a su proveedor de atención médica si presenta dolores de cabeza intensos, hemorragias nasales, cansancio o confusión, cambios en la visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, latidos cardíacos irregulares o sangre en la orina.

**Problemas cardíacos.** CABOMETRYX puede causar insuficiencia cardíaca que podría provocar la muerte. Su proveedor de atención médica podría evaluar el funcionamiento de su corazón antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX y durante el mismo. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes signos y síntomas: sensación de que el corazón late con fuerza, muy rápido o de manera irregular; falta de aire; hinchazón en los tobillos o pies; sensación de aturdimiento o cansancio.

## Información importante de seguridad

(Cont.)

**Diarrea.** La diarrea es común durante el tratamiento con CABOMETYX y puede ser grave. Si es necesario, su proveedor de atención médica podría recetarle medicamentos para tratar la diarrea. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si, con frecuencia, sus heces son blandas o líquidas.

**Un problema de la piel llamado reacción cutánea mano-pie.** Las reacciones cutáneas mano-pie son comunes con CABOMETYX y pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene erupciones, enrojecimiento, dolor, hinchazón o ampollas en las palmas de las manos o las plantas de los pies.

**Problemas hepáticos.** Pueden producirse problemas de hígado durante el tratamiento con CABOMETYX. Cuando CABOMETYX se toma en combinación con nivolumab, pueden ocurrir cambios graves en las pruebas de función hepática con más frecuencia que si toma CABOMETYX solo. Su proveedor de atención médica le pedirá análisis de sangre para controlar el funcionamiento del hígado antes de comenzar el tratamiento con CABOMETYX y durante el tratamiento con CABOMETYX.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla síntomas de problemas hepáticos como, por ejemplo, color amarillo de la piel o en el blanco de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura, sangrado o hematomas que aparecen más fácilmente de lo normal.

**Problemas con las glándulas adrenales.** Su proveedor de atención médica le controlará esta complicación. Puede recetarle una terapia de remplazo hormonal o medicamentos con corticoides, de ser necesario. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla cualquiera de los siguientes signos o síntomas: cansancio extremo, mareos o desmayos, debilidad, náuseas o vómitos.

**Proteína en la orina y posibles problemas renales.** Entre los síntomas podrían incluirse hinchazón en las manos, los brazos, las piernas o los pies. Su proveedor de atención médica le controlará este problema durante el tratamiento con CABOMETYX.

**Problemas de mandíbula graves (osteonecrosis).** Su proveedor de atención médica debería revisarle la boca antes de comenzar el tratamiento con CABOMETYX y durante el mismo. Informe a su

dentista que está tomando CABOMETYX. Es importante que practique una buena higiene bucal durante el tratamiento con CABOMETYX. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla cualquier síntoma de problemas mandibulares, incluidos dolor mandibular, dolor de dientes o llagas en las encías.

**Problemas con la cicatrización de heridas.** En las personas que toman CABOMETYX se han observado problemas para cicatrizar heridas. Informe a su proveedor de atención médica si piensa realizarse una cirugía antes o durante el tratamiento con CABOMETYX.

- Debe dejar de tomar CABOMETYX al menos 3 semanas antes de cualquier cirugía programada.
- Su proveedor de atención médica le indicará cuándo puede comenzar a tomar CABOMETYX nuevamente luego de la cirugía.

**Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR).** Durante el tratamiento con CABOMETYX, puede desarrollarse una afección llamada síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolores de cabeza, convulsiones, confusión, cambios en la visión o problemas para pensar.

**Cambio en la función tiroidea.** CABOMETYX puede ocasionar cambios en la función tiroidea, incluidos cambios en los niveles de las hormonas tiroideas en sangre. Su proveedor de atención médica le pedirá análisis de sangre para controlar el funcionamiento de la tiroides antes de comenzar el tratamiento con CABOMETYX y durante el mismo.

**Disminución de los niveles de calcio en sangre (hipocalcemia).** CABOMETYX puede ocasionarle una disminución de calcio en la sangre. Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para verificar este problema y le proporcionará calcio, de ser necesario.

**Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas:**

- rigidez o espasmos musculares
- convulsiones
- adormecimiento u hormigueo en los dedos de la mano o del pie, o alrededor de la boca
- aumento de peso repentino
- hinchazón en brazos, manos, piernas y tobillos

Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis de CABOMETYX, suspender su administración temporariamente o interrumpir el tratamiento de manera permanente si usted presenta determinados efectos secundarios.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

## Información importante de seguridad

(Cont.)

### Entre los efectos secundarios más comunes de CABOMETRYX se incluyen:

- cansancio
- náuseas y vómitos
- estreñimiento
- disminución del apetito
- pérdida de peso

### Los efectos secundarios más habituales de CABOMETRYX cuando se usa con nivolumab son los siguientes:

- cansancio
- llagas en la boca
- erupciones
- niveles bajos de la hormona tiroidea (hipotiroidismo)
- dolor en músculos, huesos y articulaciones
- disminución del apetito
- náuseas
- cambios en los sabores
- dolor en el área estomacal (abdomen)
- tos
- infección del tracto respiratorio superior

CABOMETRYX puede provocar problemas de fertilidad en hombres y mujeres que podrían afectar sus posibilidades de concebir. Hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas acerca de la fertilidad.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de CABOMETRYX. Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al 1-800-FDA-1088 o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

Si su proveedor de atención médica le receta CABOMETRYX junto con nivolumab, lea también la Guía de Medicamentos que viene con nivolumab.

**Antes de tomar CABOMETRYX**, informe a su proveedor de atención médica todas las afecciones médicas que tenga, incluida cualquiera de las siguientes:

- ha tenido un problema hepático que no sea cáncer de hígado
- tiene una historia de sangrado reciente, por ejemplo, tos o vómitos con sangre o heces negras (como brea)
- tiene una herida abierta o en proceso de cicatrización

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

- tiene presión arterial alta
- tiene bajos niveles de calcio en sangre (hipocalcemia)
- piensa realizarse una cirugía o un procedimiento dental, o se ha realizado una cirugía recientemente. Debe suspender el tratamiento con CABOMETRYX al menos 3 semanas antes de cualquier cirugía programada
- está embarazada o piensa quedar embarazada, CABOMETRYX puede hacerle daño a su bebé
  - Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica revisará su estado antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX.
  - Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y durante 4 meses después de la última dosis de CABOMETRYX.
  - Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que sean adecuados para usted.
  - Si queda embarazada o piensa que lo está, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
- si está amamantando o piensa hacerlo. No se sabe si CABOMETRYX pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento ni durante los 4 meses posteriores a la última dosis de CABOMETRYX.

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos, las vitaminas y los suplementos herbales recetados o de venta libre. CABOMETRYX y otros medicamentos determinados podrían afectarse mutuamente y provocar efectos secundarios.

### ¿Qué debo evitar mientras tomo CABOMETRYX?

**Evite** tomar jugo de pomelo, comer pomelo o tomar suplementos que contengan pomelo o hierba de San Juan durante el tratamiento con CABOMETRYX.



**¡INSCRÍBASE  
hoy mismo!**  
(ver abajo)



## Obtenga apoyo durante su tratamiento

El programa de apoyo BE CONNECTED está diseñado para ofrecer información educativa para usted o alguien a quien usted cuida que está tomando CABOMETYX y para brindarle más información sobre qué esperar durante el tratamiento.

- Reconocer efectos secundarios y trabajar con su equipo de atención médica para manejarlos
- Dónde encontrar recursos útiles
- Consejos para mejorar el estilo de vida y bienestar
- Información sobre organizaciones que pueden brindarle apoyo


**Si tiene preguntas sobre el tratamiento, hable con su equipo de atención médica.**

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.



OPDIVO® y el logo relacionado son marcas registradas y OPDIVO Qvantig™ y el logo relacionado son marcas de Bristol-Myers Squibb Company.

**EXELIXIS®**

 **CABOMETYX®**  
(cabozantinib) tablets  
60 mg | 40 mg | 20 mg